

Fraxiparine 0,8ml (7600 IE anti Xa)	Alternatieven	nadroparine - Fraxiparine®	nadroparine - Fraxodi®	fondaparinux - Arixtra®	dalteparine - Fragmin®
<b>VTE preventie (1 dd 0,8 ml)</b>	Fraxiparine 0,4 ml (3800 IE anti Xa) Fraxodi 0,6 ml (11400 IE anti Xa) Fraxodi 0,8 ml (15200 IE anti Xa) Arixtra 2,5mg	2dd Fraxiparine 0,4 ml. *	1dd Fraxodi 0,6 ml. Eerst 0,2 ml eruit spuiten en daarna de resterende 0,4 ml inspuiten.  1dd Fraxodi 0,8 ml. Eerst 0,4 ml eruit spuiten en daarna de resterende 0,4 ml inspuiten.  NB. Fraxodi is niet geregistreerd voor deze indicatie, de werkzame stof nadroparine wel (onder de naam Fraxiparine)	1dd Arixtra 2,5mg  NB. alleen geregistreerd voor VTE preventie bij: - patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep ondergaan aan de onderste ledematen.  - patiënten die abdominale chirurgie ondergaan en die een verwacht verhoogd risico hebben op trombo-embolische complicaties.  - medische patiënten bij wie een hoog risico op VTE verwacht kan worden en die geïmmobiliseerd zijn te wijten aan een acute ziekte.	7500 IU 1dd
<b>DVT behandeling (2dd 0,8 ml)</b>	Fraxiparine 0,4 ml (3800 IE anti Xa) Fraxodi 0,6 ml (11400 IE anti Xa) Fraxodi 0,8 ml (15200 IE anti Xa)	2x2dd Fraxiparine 0,4 ml. **	1dd Fraxodi 0,8 ml. <b>Pat melden: ander aantal injecties</b>  1dd Fraxodi 0,6ml + 0,4 ml Fraxiparine*  ALG: NB overleg arts of naar 1dd injectie kan worden overgegaan (kan bij spec pat.groepen niet gewenst zijn zoals nierinsufficiëntie of maligniteit)  2dd Fraxodi 0,6 ml. Eerst 0,2 ml eruit spuiten en daarna de resterende 0,4 ml inspuiten.  2dd Fraxodi 0,8 ml. Eerst 0,4 ml eruit spuiten en daarna de resterende 0,4 ml inspuiten.	NA	100 IU/kg 2dd, of 200 IU/kg 1dd

\*Voor de volledigheid wijzen we u erop dat beide injecties direct na elkaar op verschillende plaatsen moeten worden toegediend, bv in een huidplooi links en rechts ten opzichte van de navel. Het verdient aanbeveling om de patiënt te melden dat er eventueel een ander aantal injecties wordt gegeven.

\*\*Voor de volledigheid wijzen we u erop dat tweemaal daags beide injecties direct na elkaar op verschillende plaatsen moeten worden toegediend, bv in een huidplooi links en rechts ten opzichte van de navel. Het verdient aanbeveling om de patiënt te melden dat er een ander aantal injecties wordt gegeven.

Bron: GSK