

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak

Tandarts: taken en verantwoordelijkheden

Patiënt start met een cumarine

- De tandarts heeft niet altijd inzage in het medicatie-dossier van de patiënt. Daarom vraagt een tandarts bij elke controle aan de patiënt naar het gebruik van een cumarine.

Patiënt is ingesteld op een cumarine

- Bij het gebruik van een mandibulair blok is er een verhoogd bloedingsrisico. De tandarts overweegt daarom het verdoven via infiltratie of ligamentaire anesthesie¹.
- De tandarts schrijft bij voorkeur paracetamol voor als pijnstillen en is terughoudend met het voorschrijven van NSAID's aan patiënten die een cumarine gebruiken. Zo nodig overlegt de tandarts met de apotheker.

Afspraken tandarts en trombosedienst

- De tandarts en de trombosedienst spreken regionaal af op welke wijze en hoeveel tijd van te voren de tandarts of de patiënt de voorgenomen ingreep meldt bij de trombosedienst.
- Voor tandheelkundige ingrepen met een laag bloedingsrisico zoals een extractie van 1 tot 3 kiezen of mondhygiënische ingreep, geldt dat het bloedingsrisico laag is. De ingreep kan in principe zonder stoppen van de cumarinebehandeling plaatsvinden. Regionaal spreken de tandarts en de trombosedienst af op welke wijze en hoeveel tijd van te voren de tandarts of de patiënt de voorgenomen ingreep meldt bij de trombosedienst. De trombosedienst verifieert de aard van de ingreep en controleert of het antistollingsniveau in het therapeutische gebied ligt en de ingreep verantwoord kan plaatsvinden².

Afspraken tandarts en apotheker

- Om lokaal het bloedingsrisico te verlagen, kan de tandarts tranexaminezuur 5% mondspoeling voorschrijven³. Deze mondspoeling is een magistrale bereiding⁴. Daarom moet de tandarts tijdig de mondspoeling bestellen bij de apotheek. Tandarts en apotheker spreken met elkaar hiervoor een termijn af. De mondspoeling heeft een houdbaarheid van 2 weken.

Patiënt gebruikt een TAR of LMWH: taken en verantwoordelijkheden

- Tandartsen vragen voor een ingreep aan de patiënt na of zij een TAR gebruiken. In principe hebben ingrepen in de mond een laag bloedingsrisico en hoeft de TAR niet worden gestaakt. Bij gebruik van twee of meer antistollingsmiddelen overlegt de tandarts met de behandelaar die de behandeling heeft ingesteld. Tandartsen volgen bij injecties indien mogelijk het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam)-advies op en overwegen het verdoven via infiltratie of ligamentaire anesthesie².
- Bij patiënten die een TAR gebruiken schrijft de tandarts bij voorkeur paracetamol voor in plaats van een NSAID.

¹ Een mandibulair blok (waarbij de linker- of rechterhelft van de onderkaak - en de helft van de tong - worden verdoofd) wordt achterin de mond gegeven, waarbij de naald vrij ver wordt ingebracht. Er bestaat een kans dat een bloedvat wordt geraakt waardoor een hematoom kan ontstaan.

² ACTA-richtlijn: Beleid bij tandheelkundige ingrepen tijdens anti-trombotische behandeling bloedstollingsbeïnvloedende medicatie. september 2010. http://www.acta.nl/nl/Images/Richtlijn%20%20ACTA%20antistolling%20september%202010_tcm81-183934.pdf
Een voorbeeld voor een af te spreken termijn is vijf dagen.

³ Tranexaminezuur 5% mondspoeling verlaagt het bloedingsrisico. Na de ingreep spoelt de patiënt gedurende 5 dagen, 4 keer per dag met 10 ml mondspoeling. De mondspoeling wordt niet doorgeslikt. (Aframian DJ, Lalla RV, Peterson DE. Management of dental patients taking common hemostatisaltering medications. Oral Surg Oral Med Oral Pathol OPral Radiol Endod 2007; 103:S45. e1-S45e11).

⁴ LNA (Laboratorium Nederlandse Apothekers) mededeling (oktober 2009).