



Autohaler™ 50 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Mild tot matig astma	<b>50 µg 2 dd</b>	<b>50-200 µg 2 dd</b>
Ernstig astma	100 µg 2 dd	tot 400 µg 2 dd



Autohaler™ 100 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Mild tot matig astma	50 µg 2 dd	<b>50-200 µg 2 dd</b>
Ernstig astma	<b>100 µg 2 dd</b>	<b>tot 400 µg 2 dd</b>



Inhalator 50 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Mild tot matig astma	<b>50 µg 2 dd</b>	<b>50-200 µg 2 dd</b>
Ernstig astma	100 µg 2 dd	tot 400 µg 2 dd



Inhalator 100 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Mild tot matig astma	50 µg 2 dd	<b>50-200 µg 2 dd</b>
Ernstig astma	<b>100 µg 2 dd</b>	<b>tot 400 µg 2 dd</b>



Antistatische voorzetskamer

Flow-Vu™  
inhalatie-indicator



AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™  
Kindermasker 1-4 jaar + Qvar 50 µg



AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™  
Kindermasker 1-4 jaar + Qvar 100 µg



AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™  
Mondstuk 4+ jaar + Qvar 50 µg



AeroChamber Plus™ met Flow-Vu™  
Mondstuk 4+ jaar + Qvar 100 µg

### Qvar omzetschema

Dosering (µg/dag)	Qvar EFA	fluticason	budesonide	beclometason
Kinderdosis	100	125	200	200 - 250
Lage dosis	200	250	400	400 - 500
Gem. dosis	400	500	800	800 - 1.000
Hoge dosis	800	1.000	1.600	1.600 - 2.000



Autohaler™ 100 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Acute benauwdheid	100 µg	100-200 µg
Maximale dagdosis	400 µg	800 µg
Profylaxe inspanningsastma	100 µg	200 µg



Inhalator 100 µg

	Kinderen:	Volwassenen:
Acute benauwdheid	100 µg	100-200 µg
Maximale dagdosis	400 µg	800 µg
Profylaxe inspanningsastma	100 µg	200 µg

Kijk op [www.mijnaerochamber.nl](http://www.mijnaerochamber.nl) voor een overzicht van alle AeroChambers en de vergoeding.

Teva Nederland  
Service Desk 023 5147 157  
[www.tevanederland.nl](http://www.tevanederland.nl)



NHG-standaard 'Astma bij kinderen' 2006<sup>1</sup>

## Inhalatievorm en startdoseringen

0-4 jaar: dosisaërosol + voorzetkamer met kindermasker	
Kortwerkend $\beta_2$ -sympathicomimeticum	100 $\mu$ g, zo nodig tot 4 dd 1 à 2 puffs
Beclometason	100 $\mu$ g 2 dd 2 puffs
Budesonide	200 $\mu$ g 2 dd 1 puff
Fluticason	50 $\mu$ g 2 dd 2 puffs
<b>Beclometason Extrafijn</b>	<b>100 <math>\mu</math>g 2 dd 1 puff</b>

5-6 jaar: dosisaërosol + voorzetkamer met mondstuk	
Kortwerkend $\beta_2$ -sympathicomimeticum	100 $\mu$ g, zo nodig tot 4 dd 1 à 2 puffs
Beclometason	100 $\mu$ g 2 dd 2 puffs
Budesonide	200 $\mu$ g 2 dd 1 puff
Fluticason	125 $\mu$ g 2 dd 1 puff
<b>Beclometason Extrafijn</b>	<b>100 <math>\mu</math>g 2 dd 1 puff</b>

>6 jaar: droogpoederinhalator* of Autohaler™	
Kortwerkend $\beta_2$ -sympathicomimeticum	100-400 $\mu$ g (salbutamol), zo nodig tot 4 dd 1 inhalatie
Beclometason	200 $\mu$ g 2 dd 1 inhalatie
Budesonide	200 $\mu$ g 2 dd 1 inhalatie
Fluticason	100 $\mu$ g 2 dd 1 inhalatie
<b>Beclometason Extrafijn</b>	<b>100 <math>\mu</math>g 2 dd 1 puff via Autohaler™</b>

\*Bij sommige droogpoederinhalatoren gelden lagere doseringen: raadpleeg het *Farmacotherapeutisch Kompas*.

Ontleend aan:

<sup>1</sup> NHG-standaard 'Astma bij kinderen' (2e herziening) Huisarts Wet. 2006;49 (11): 557-572


<sup>2</sup> Jongste, J.C. de, Vrijlandt, E.J.L.E.(red.), Astma bij kinderen. Samenvatting van de herziene richtlijnen van de Sectie Kinderlongziekten van de NVK. Utrecht; Nov2008; ISBN 978-90-9023508-0.

SKL-Richtlijnen 'Astma bij kinderen' 2008<sup>2</sup>

## Stappenplan onderhoudsbehandeling

Gebruikte afkortingen

**ICS** inhalaticorticosteroiden  
**LTRA** leukotriëne receptor antagonist  
**LABA** langwerkend beta-mimeticum  
**SABA** kortwerkend beta-mimeticum



Klachten na stap 2 ondanks adequate opvolging van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze adviezen en adequate inhalatietechniek geeft reden tot verwijzing naar de kinder(long)arts.