



Het gebruik van Orgalutran

Een handleiding voor
patiënten



Orgalutran[®]
ganirelix

1. Inleiding

In het kader van uw vruchtbaarheidsbehandeling heeft uw arts u Orgalutran voorgeschreven. In deze instructiefolder leest u wat Orgalutran precies is, hoe u het moet bewaren, hoe u het moet toedienen en welke mogelijke bijwerkingen u kunt verwachten. Als u vragen over Orgalutran hebt, is het belangrijk dat u de bijsluiter aandachtig leest of uw arts raadpleegt.

2. Wat is Orgalutran en waarvoor wordt het gebruikt?

Orgalutran is voorgeschreven als onderdeel van uw vruchtbaarheidsbehandeling (bijvoorbeeld IVF of ICSI). Orgalutran voorkomt eventuele voortijdige pieken van het Luteïniserend Hormoon (LH).

Orgalutran bevat 0,25 mg ganirelix (het actieve bestanddeel), een GnRH-antagonist in 0,5 ml oplossing. Orgalutran wordt geleverd als steriele, kant-en-klare, voorgevulde spuit. Orgalutran wordt onder de huid (subcutaan) toegediend.

Orgalutran werkt doordat het uw natuurlijke LH-productie vermindert. Hierdoor kunnen de eitjes (follikels) in de eierstokken gestimuleerd worden tot groei, terwijl de kans op een voortijdige LH-stijging, die een negatief effect kan hebben op de resultaten van de behandeling, wordt geminimaliseerd.

3. Het bewaren van Orgalutran

Orgalutran moet bewaard worden in de originele verpakking en beschermd tegen het zonlicht. Bewaar Orgalutran bij een temperatuur van 2 tot 30 °C.

Houd Orgalutran buiten bereik van kinderen.

4. Het gebruik van Orgalutran

Uw arts zal u vertellen wanneer u met het injecteren van Orgalutran moet beginnen.

Vaak zal dit zijn vanaf dag 5 van de FSH-injecties.

Meestal zult u Orgalutran rond dezelfde tijd moeten toedienen als de FSH-injectie, maar wel op een andere plek (uw bovenbeen is een goede plaats voor Orgalutran, terwijl de FSH-injecties meestal in de buik gegeven worden). U mag Orgalutran en de FSH-oplossing niet vermengen.

Uw arts zal u vertellen wanneer u kunt stoppen met de Orgalutran-injecties.

5. Orgalutran-injectie vergeten

Zoals al gezegd, moet Orgalutran elke dag op ongeveer dezelfde tijd toegediend worden. Als u zich realiseert dat u een injectie vergeten hebt, moet u deze alsnog zo snel mogelijk toedienen. Dien echter nooit een dubbele dosis toe om de vergeten injectie te compenseren.

Als u meer dan 6 uur te laat bent met het toedienen van Orgalutran (dat wil zeggen meer dan 30 uur na de laatste Orgalutran-injectie), dan moet u de injectie toedienen en zo snel mogelijk contact opnemen met uw behandelend arts of zijn IVF-kliniek.

6. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle medicijnen kan ook Orgalutran bijwerkingen hebben. Er kunnen bijvoorbeeld lokale huidklachten zoals roodheid en zwelling 1 uur na de injectie optreden. Deze klachten verdwijnen over het algemeen snel.

Andere gemelde bijwerkingen zijn hoofdpijn en misselijkheid.

In het algemeen zijn er bijwerkingen en ongewenste effecten die gerelateerd zijn aan de vruchtbaarheidsbehandeling zelf of ten gevolge van de stimulatie van de follikels, zoals buikpijn, overstimulatie, buitenbaarmoederlijke zwangerschap of miskramen.

Als u deze of andere bijwerkingen hebt, neem dan contact op met uw behandelend arts of zijn IVF-kliniek.

7 Stap voor stap toedienen van Orgalutran



Vorbereiden van de injectieplaats

Was uw handen met water en zeep. Maak de huid 5 centimeter rondom de injectieplaats schoon met een alcoholgaasje. Laat de huid een ogenblik drogen (dit duurt ongeveer 1 minuut).



Openen van de buitenverpakking (doosje) en de plastic verpakking


Terwijl u wacht op het drogen van de alcohol kunt u de buitenverpakking (het doosje) openen en de plastic verpakking eruit halen. Haal nu de spuit voorzichtig uit de plastic verpakking. U ziet dat een naald, met een grijze beschermkap, aan de spuit bevestigd is.



De spuit klaarmaken voor injectie

Verwijder de grijze beschermkap van de naald, met de naald naar boven gericht. Tik zachtjes met uw vinger tegen de patroonhouder, zodat eventuele luchtbelletjes naar de punt van de naald gaan. Trek de plunjer (stamper) eerst een klein beetje uit de spuit totdat deze beweegt. Duw hierna voorzichtig de plunjer naar boven totdat u een druppel vloeistof uit de naald ziet komen. Nu bent u klaar voor het toedienen van Orgalutran.





Het injecteren

Pak een huidplooi tussen duim en wijsvinger. Steek de naald onder een hoek van 45° in de huid. Druk de plunjer langzaam en geleidelijk volledig in totdat alle vloeistof is geïnjecteerd.



Verwijderen van de spuit

Trek de naald snel uit uw been en druk een alcoholgaasje op de injectieplaats. Gooi de spuit met de naald in een naaldencontainer of glazen potje. Let op: deze lege, gebruikte spuit kunt u niet meer gebruiken voor een volgende injectie.