



U bent klaar om te injecteren

- Kies een injectieplaats op uw maagstreek (buik) of dij. Vermijd uw navel en taille. Als u heel mager bent, mag u alleen uw dij voor injectie gebruiken. U moet telkens een andere plaats gebruiken wanneer u zichzelf injecteert. Injecteer PegIntron niet in een plek waar de huid geïrriteerd, rood, gekneusd of geïnfecteerd is, of littekens, striemen of knobbeltjes heeft.
- Veeg met een nieuw alcoholdoekje over de injectieplaats. Laat de huid aan de lucht drogen.
- Pak een huidplooi vast op de plaats die u heeft schoongemaakt voor injectie.
- Druk de voorgevulde pen tegen de huid zoals aangegeven in afbeelding 10. De beschermer zal automatisch teruggliden, zodat het geneesmiddel via de naald geïnjecteerd kan worden.
- **Houd de voorgevulde pen 15 seconden tegen de huid.**

Let op: de voorgevulde pen zal gedurende 10 seconden een klikgeluid maken – afhankelijk van uw dosis. Houd de pen nog 5 seconden tegen de huid om zeker te zijn dat u de volledige dosis krijgt. Let op: zodra de voorgevulde pen wordt weggenomen van de huid, wordt de naaldbeschermer vergrendeld.



Afbeelding 10: Injectie in de dij



Weggooiën van de injectiematerialen

De voorgevulde pen, naald en alle injectiematerialen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten na de injectie worden weggegooid. Gooi de gebruikte voorgevulde pen veilig weg in een afgesloten houder. Vraag uw zorgverlener of apotheker om een geschikte houder.

Gebruiksaanwijzing PegIntron Pen

Hoe wordt de PegIntron voorgevulde pen gebruikt

In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u zichzelf een injectie kunt geven met de voorgevulde pen. Lees de instructies aandachtig door en volg ze stap voor stap. Uw zorgverlener zal u uitleggen hoe de injecties toegediend moeten worden. Begin pas met het toedienen van een injectie als u er zeker van bent dat u weet hoe u de voorgevulde pen moet gebruiken. Elke voorgevulde pen is alleen voor eenmalig gebruik.


Vorbereiding

- Neem een goed verlicht, schoon, vlak werkoppervlak zoals een tafel.
- Neem de voorgevulde pen uit de koelkast. Bekijk de datum die op het doosje na EXP gedrukt staat en controleer of de vervaldatum niet overschreden is. Gebruik de pen niet als de vervaldatum overschreden is.
- Haal de voorgevulde pen uit het doosje.
- Leg de voorgevulde pen op een vlak schoon oppervlak. Wacht om hem op kamertemperatuur te laten komen (maar niet meer dan 25 °C). Dit kan tot 20 minuten duren.
- Was uw handen goed met zeep en warm water. Houd uw werkplek, uw handen en de injectieplaats schoon om het risico op infectie te verlagen.

U vindt de volgende benodigdheden in de verpakking:

- een voorgevulde pen (CLEARCLICK);
- een opzetnaald;
- 2 alcoholdoekjes.

Opzetnaald →




Mengen

- Houd de voorgevulde pen rechtop met de instelknop naar beneden.
- Draai de instelknop naar nummer 1 (zie afbeelding 1). U hoort mogelijk een 'klik' geluid.



Afbeelding 1

- **NIET SCHUDDEN OM TE MENGEN.**
Draai om te mengen de voorgevulde pen twee keer voorzichtig ondersteboven (zie afbeelding 2).



Afbeelding 2

- Kijk door het venstertje. De oplossing moet helder en kleurloos zijn voor gebruik. Er kunnen enkele luchtbelletjes aanwezig zijn, maar dit is normaal. Niet gebruiken als de oplossing verkleurd is of deeltjes bevat.

Plaats de naald

- Draai de instelknop naar nummer 2 (zie afbeelding 3).
U hoort mogelijk een 'klik'.



Afbeelding 3

- Veeg met een alcoholdoekje over de bovenkant van de voorgevulde pen, waar de naald geplaatst wordt (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4

- Verwijder het gele papiertje van de naaldtop voordat u de opzetnaald op de voorgevulde pen plaatst (zie afbeelding 5).



Afbeelding 5

- Houd de voorgevulde pen rechtop en duw de naald stevig recht naar beneden (zie afbeelding 6). U kunt daarbij een zacht geluid horen.



Afbeelding 6

- Verwijder de naaldtop. Het zou kunnen dat u wat vloeistof uit de naald ziet druppelen (zie afbeelding 7). Dit is normaal.



Afbeelding 7

Stel de dosis in

- Draai de instelknop naar **uw voorgeschreven dosis** (zie afbeelding 8). U kunt daarbij klikgeluiden horen. Let op: de naaldbeschermer zal automatisch **OMHOOG POPPEN** terwijl u draait (zie afbeelding 9). U mag vóór de injectie links- of rechtsom draaien om elke gewenste dosis in te stellen.



Afbeelding 8

Afbeelding 9