

# Stadiëring van CNS obv GFR en albuminurie versus prognose

De KDIGO-classificatie

- Geen CNS (88%)
- Mild verhoogd risico (9,2%)
- Matig verhoogd risico (2,0%)
- Sterk verhoogd risico (<1%)

|     |                             |       |  | Albuminurie-categorieën   |                             |                          |
|-----|-----------------------------|-------|--|---|-----------------------------|--------------------------|
|     |                             |       |  | Beschrijving en range   |                             |                          |
|     |                             |       |  | A1  | A2                          | A3                       |
|     |                             |       |  | Normaal   | Matig verhoogd              | Ernstig verhoogd         |
|     |                             |       |  | <30 mg/g<br><3 mg/mmol  | 30-299 mg/g<br>3-29 mg/mmol | ≥300 mg/g<br>≥30 mg/mmol |
|     |                             |       |  | GFR-categorieën<br>Beschrijving<br>en range<br>(ml/min/1.73m <sup>2</sup> ) | G1                          | Normaal of hoog          |
| G2  | Mild afgenomen              | 60-89 |  |   |                             |                          |
| G3a | Mild tot matig afgenomen    | 45-59 |  |   |                             |                          |
| G3b | Matig tot ernstig afgenomen | 30-44 |  |   |                             |                          |
| G4  | Ernstig afgenomen           | 15-29 |  |   |                             |                          |
| G5  | Nierfalen                   | <15   |  |   |                             |                          |